

TOEVOEGEN VAN KOOLZAADVET (MELKVEE)

Aan welke randvoorwaarden moet u voldoen?

- De maatregel geldt voor het **lacterend melkvee** op uw bedrijf.
- U voegt **350 gram koolzaadvet** per lacterend dier per dag op droge stof basis toe aan het rantsoen. Dit wordt toegediend onder vorm van koolzaadschroot, koolzaadkoek, geplette zaden, geëxtrudeerd zaad, ... maar niet onder de vorm van vloeibare koolzaadolie of onbewerkte zaden.
- U dient dit rantsoen toe **gedurende 200 opeenvolgende dagen** aan uw dier vanaf de eerste dag na kalving.



Door het toedienen van het koolzaadvet reduceert u de methaanuitstoot van uw dier met **5%** per dag dat het dier het rantsoen toegediend krijgt.



Het toedienen van het koolzaadvet brengt een **hogere kostprijs** van het krachtvoer met zich mee, maar dit kan **deels gecompenseerd** worden door de **vervanging van andere grondstoffen** en door een **mogelijks hogere melkproductie**.



Zijn er neveneffecten door het toedienen van het voedermiddel?

- Er wordt aangeraden om de maatregel enkel de eerste 200 dagen na kalving toe te passen vanwege het risico op vervetting door de hogere energie-inhoud.
- Een optimale melkproductie wordt behaald bij een totaal vetgehalte van 4 tot 6% vet op het totale rantsoen (droge stof basis). Een te hoog vetgehalte van meer dan 6% kan dan weer leiden tot negatieve effecten op de melkproductie.
- Door de hogere energie-inhoud heeft het naar verwachting een positieve impact op de melkproductie, maar ook een mogelijke verlaging van het vetgehalte in de melk.



Hebt u nog vragen of wil u meer informatie over deze maatregel?

- Contacteer uw veevoederadviseur